

	EPİDURAL ANESTEZİ UYGULAMA TALİMATI	Doküman No	AML.TL.04
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	0
		Rev.Tarihi	-
		Sayfa No	2/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ:

Epidural anestezi uygulamasının kurallara uygun yapılması için bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat, epidural anestezi uygulamada yöntemlerini, Anestezi Uzmanları ve Teknisyenlerini kapsar.

3. TANIMLAR

Özel bir tanım yoktur.

4.UYGULAMA

4.1.KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER

• Steril eldiven	• Epidural klemp
• Steril spanç	• Epidural kateter seti
• Betadin	Hipotansiyon riski düşünülerek 1 amp efedrin 9 ml sf le sulandırılır
• Steril delikli örtü	• Lokal anestezi
• 10,5,2 ml lik enjektör	• Serum fizyolojik ampul
• Steril kare kompres	• Küçük tas
• Boyama klemp	

4.2.Hasta, servis hemşiresinden ameliyathaneye anestezi teknisyeni ve yardımcı personel tarafından alınır.

4.3.Anestezi makinesi ve genel anestezi için diğer araç gereç hazır bulunur. Obstetrik girişimlerde yenidoğan için hazırlık yapılır.

4.4.Anestezi teknikeri tarafından EKG, NIBP, SpO₂ monitorizasyonu yapılır ve maske ile O₂ verilir. İlk vital bulguları Anestezi Takip Ve Uyanma Odası Transfer Formu'na kaydedilir.

4.5. Hastaya, tercihen sol üst ekstremiteden geniş bir damar yolu açılarak 1000-1500 ml sıvı infüzyonu yapılır

4.6.. Hastaya lateral veya oturur (özellikle obez hastada) pozisyon verilir. Hastanın pozisyonunun korunması için yardımcı personel hastaya destek olur.

4.7.Anestezi hekimi kendisini tanıtır, yapılacak işlemi hastaya anlatır ve her aşamada hastayı bilgilendirir.

4.8.Anestezi hekimi, steril eldiven giyer.

4.9.Anestezi teknikeri kullanılacak steril seti ve malzemeleri açar ve tase batikon koyar. Anestezi hekimi girişim yapılacak bölgeyi batikon ile temizler.

4.10.Anestezi hekimi ince bir iğne ile (ppd veya dental uçlu iğne) L3-4, L4-5 veya L2-3 aralığından giriş noktasına %2 lidokain ile ciltte bir kabarıklık oluşturarak ciltaltına infiltre eder.

4.11.Tuohy iğnesi ile açıklığı yukarı bakacak şekilde direnç kaybı veya asılı damla tekniği ile epidural aralığa girilir ve kateter yerleştirilir.

4.12.Test dozu (%2 lidokain + adrenalin 15 mcg) 3 ml verilir.

EPİDURAL ANESTEZİ UYGULAMA TALİMATI

Doküman No	AML.TL.04
Yayın Tarihi	01.07.2009
Rev. No	0
Rev.Tarihi	-
Sayfa No	2/2

4.13.Kalp hızı 25 saniyede %20 artmaz ve spinal anestezi bulguları görülmez ise hastaya uygun doz ve miktarda ilaç epidural oranda verilir.

4.14.Hastaya operasyona uygun pozisyona getirilir. Kan basıncı düşerse 5-10 mg iv enjekte edilir.

4.15.Soğuk uygulama ve künt bir iğne ucu ile anestezi düzeyi kontrol edilir.

4.16.Anestezi düzeyi yeterli olduğunda cerrahi işleme izin verilir.

4.17. Anestezi Takip Ve Uyanma Odası Transfer Formu'na yapılan işlem ve hastanın vital bulguları 5'er dakikalık aralıklarla kaydedilir.

5. İLGİLİ KAYITLAR

AML.FR.01 Anestezi Takip Ve Uyanma Odası Transfer Formu