

İLAÇ BESİN ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ

Doküman No	ECZ.LS.02
Yürürlük tarihi	01.02.2009
Rev. No	00
Rev. Tarihi	
Sayfa No:	'3/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Kalite Temsilcisi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

KULLANILAN İLAÇ	TİCARİ İSMİ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ETKİLEŞİM SONUÇLARI	ÖNLEMLER
Aluminyum içerenler	Kompensan, Gaviscon, Mucaïne, Talcid, Dank	Portakal suyu	Aluminyum emilimini bozar	Aynı anda kullanmayın, en az 2 saat ara verin

Antibiyotikler

Pensilin oral		Asitli besinler; Kafein, domates, meyva suları	Asitli besinlerden dolayı artan mide asidi ilacın midedeki harabiyetini artırır.	Birlikte kullanılmamalı
		Tüm besinler	Etkinliği hızlandırır.	Aç karnına alınmalıdır.
Tekrasiklin	Tetra, Tetralet, Tetramin			
Siprofloksasin	Ciflosin, Cifluran, Ciprasid, Cipro, Ciproktan, Loxasid, Proxacin, Roflazin, Roxin, Sanset, Sifloks, Siprobek, Siprosan, Sispres, Ürociproxin	Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumca zengin besinler	Kalsiyum ilacın kandaki emilimini azaltabilir.	Birlikte kullanılmamalı

ACE İnhibitörleri

Kaptopril	Kapril, Kaptopril			
Enalapril	Enalap, Enapril, Konveril, Renitec, Vasolapril			
Lisinopril	Acerilin, Rilace, Zestril, Sinopryl, Zestoretic, Sinoretic	Potasyumca zengin besinler; muz, incir, buğday, portakal, kuru meyveler, tuzlu besinler, enginar, brokoli, brüksel lahanası, patates(kızarmış, fırında), kabak, ıspanak, domates(salça, Püre), kayısı, ananas suyu, kavun, kuru fasulye, bezelye, mercimek, kuru hindistan cevizi, kuru hurma, taze nektarinler, şeftali, nar, greyfurt, avakado, hardal	Vücuttaki potasyum düzeyini yükselttikler.	Birlikte kullanılmamalı
Kinapril	Acuitel			
Moexpril	Türkiye'de preparatı yok.			
Perindopril	Coversyl, Preterax			
Ramipril	Delix			
Fosinopril	Monopril			
Delapril	Türkiye'de preparatı yok.			
Benazepril	Cibacen, Cibadrex			
Silazapril	İnhibace			
Trandolapril	Tarka, Gopten			
İmidapril	Türkiye'de preparatı yok.			

İLAÇ BESİN ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ

Doküman No	ECZ.LS.02
Yürürlük tarihi	01.02.2009
Rev. No	00
Rev. Tarihi	
Sayfa No:	'3/2

Ca Kanal Blokerleri

Felodipine	Plendil	Greyfurt suyu, meyan kökü	İlacın plazma konsantrasyonlarını artırır	Birlikte kullanılmamalı.
Nicardipine	Türkiye'de preparatı yok.			
Nifedipine	Adalat,Kardilat,Nidicard,Nidilat			
Nimodipine	Nimotop			
Nisoldipine	Syscor			
Verapamil	İsoptin,Veroptin,Fibrocard, Tarka			
Amlodipin	Amlodis,Amlocard,Amlovas,Diloptin,Monovas,Nipidol,Norlopin,Norvadin,Norvasc,Vasocard,Vazkor			
Diltiazem	Altizem,Dilcor,Dilticard, Diltizem			
Isradipin				
Lasidipin				
Nitrendipin	Baypres,Nitrensin			

Benzodiazepinler

Midazolam	Dormicum	Greyfurt suyu	İlacın plazma konsantrasyonlarını artırır	Birlikte kullanılmamalı.
Triazolam	Türkiye'de preparatı yok.			
Diazepam	Diazem,Lizan,Nervium			
Alprazolam	Apo-Alpraz,Xanax			
Klordiazepoksit	Libkol,Librax,Klipaks			
Lorazepam	Ativan			

Statinler

Lovastatin	Türkiye'de preparatı yok.	Greyfurt suyu	İlacın plazma konsantrasyonlarını artırır	Birlikte kullanılmamalı.
Atorvastatin	Ator.Lipitor			
Simvastatin	Lipovas,Zocor,Zovatin			
Fluvastatin	Lescol			
Pravastatin	Pravachol			
Serivastatin	Lipobay			

İLAÇ BESİN ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ

Doküman No	ECZ.LS.02
Yürürlük tarihi	01.02.2009
Rev. No	00
Rev. Tarihi	
Sayfa No:	'3/3

Vitaminler

C vitamini	Ester-vit, Redoxon, Vitabiol C	Süt	C vitamininin etkinliğini azaltır	Aynı anda kullanmayın; en az iki saat ara verin
------------	--------------------------------	-----	-----------------------------------	---

Tiroid ilaçları	Levotiron, Tefor, Tiromel	İyod içeren besinler	İlacın etkinliği azalır	Aç karnına alınmalıdır.
------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------

Anti Ülser İlaçlar

Bizmut şelatı	Pylorid	Süt ve süt içeren besinler	İlacın etkinliği azalır	Büyük miktarda alınmamalı; kahveye katılan küçük miktarlar önemli değildir.
---------------	---------	----------------------------	-------------------------	---

Alendronat	Fosamax	Tüm Besinler	İlacın etkinliği azalır	Aç karnına alınmalıdır.
-------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------------

Östrojen ve oral kontraseptifler	Diane, Desolett, Miranova, Yasmin, Minulet, Climen, Premelle, Divina	Greyfurt	İlacın etkinliği azalır	Birlikte kullanılmamalı.
---	--	----------	-------------------------	--------------------------

İmmüsupresanlar

Siklosporin	Sandimmun	Greyfurt	İlacın etkinliği azalır	Aynı anda kullanmayın; en az iki saat ara verin
-------------	-----------	----------	-------------------------	---

Antikanser ajanlar (oral)				
---------------------------	--	--	--	--

Etoposid	Vepesid	Greyfurt	İlacın etkinliği azalır	Aynı anda kullanmayın; en az iki saat ara verin
Merkaptopurin	Puri-nethol			
Methotrexate				
Busulfan	Myleran			
Estramustin	Estracyt			
Kapesitabin	Xeloda			
Fluorourasil	UFT			
Temozolomid	Temodal			
Hidroksikarbamid	Hydrea			
İmatinib	Glivec			
Tretinoin	Vesanoid			
Talidomid	Thalidomide			

Zafirlukast	Acculate	Tüm Besinler	İlacın etkinliği azalır	
--------------------	----------	--------------	-------------------------	--